

- болезненность или ощущение инородного тела в задней части глотки. Затруднение при глотании, жевании, речи или движениях языка или челюсти;
- изменение характера прикуса или прилегания зубных протезов.

### Меры профилактики и предупреждения рака ротовой полости

1. Своевременное прохождение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров
2. Своевременное лечение предопухолевых состояний.
3. Соблюдение гигиены полости рта – очищение зубов от пищевых остатков и зубного налета с помощью индивидуальных гигиенических процедур (чистка зубов, полоскание рта).
4. Отказ от вредных привычек – курение, включая жевательный и нюхательный табак, не злоупотреблять алкоголем.
5. Рациональное, сбалансированное питание.

**Соблюдение перечисленных рекомендаций позволит снизить риск развития онкологических заболеваний полости рта.**

Министерство здравоохранения Забайкальского края  
ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

# Профилактика онкопатологии полости рта



## Наиболее частые формы и типичные симптомы рака ротовой полости

Злокачественные опухоли – поражают чаще язык, затем область дна ротовой полости, щеки, альвеолярные отростки челюсти.

Опухоли красной каймы губ в 95% локализуются на нижней губе, однако протекают более доброкачественно, чем опухоли верхней губы.

**Развитию злокачественных опухолей** обычно предшествуют предопухолевые состояния: лейкоплакия, папилломатоз, гиперкератоз, эрозивно-язвенная форма красного плоского лишая, лучевые стоматиты, а также хронические язвы и трещины, травмы тканей ротовой полости, а также курение, прием алкоголя, воздействие токсических веществ.

**Сама опухоль может представлять собой** узелок либо уплотнение, изъязвление слизистой оболочки.

2019 год

### Курение и рак полости рта

Одной из основных предрасполагающих факторов роста онкологических заболеваний полости рта является курение.

- Курящие чаще болеют раком полости рта, чем некурящие. Самая высокая распространенность онкологии ротовой полости – дно полости рта, самая низкая – твердое небо.
- Употребление «бесдымных» табачных изделий (снаффа и других видов жевательного и нюхательного табака) увеличивают риск заболевания раком слизистой оболочки щек, губ и десен в 50 раз.





### К типичным симптомам относятся:

- припухлость или утолщение слизистой оболочки, появление уплотнений или «шишек», шероховатых участков, корок или эрозий на слизистой оболочке губ, десен или на других участках ротовой полости;
- появление бархатисто-белых, красных или пятнистых (красно-белых) пятен в ротовой полости;
- беспричинное кровотечение в полости рта;
- хронические язвы на слизистой оболочке полости рта, которые легко кровоточат и не заживают в течение 2 недель и более;

